
Состав и форма выпуска

Мазь для наружного применения.

Действующее вещество: 1 г мази содержит 10 мг титрованного экстракта центеллы азиатской.

Вспомогательные вещества: стеарат гликоля, пропиленгликоль, жидкий парафин, гераниевое масло без терпенов, лавандовое масло без терпенов, чистая вода.

Фармакологические свойства

Оказывает противовоспалительное, противомикробное и противоожоговое действие, стимулирует регенерацию. Угнетая рост фибробластов и стабилизируя лизосомальные мембраны, действует на различные стадии синтеза коллагена фибробластами, увеличивая его количество. Способствует развитию эластичной ткани и восстановлению коллагеновой структуры стенки вен, что проявляется очищением язв с их последующим краевым заживлением и уменьшением отека. Наиболее часто Мадекассол применяется именно в мазовой форме.

Мазь Мадекассол предназначен для защиты и регенерации кожи, нормализации ее структуры и функционирования. Применяется также для лечения склеродермии, пеленочного дерматита, послеоперационного и послеродового восстановления тканей, опрелостей.

Показания к применению

Назначение мази Мадекассол оправдано при различных нарушениях целостности кожи:

- послеоперационные швы;
- мелкие порезы и неглубокие раны различного происхождения;
- разрывы тканей во время родов.

Массаж с мазью Мадекассол поможет:

- улучшить состояние рубцов после операций и ожогов;
- улучшить состояние клапанов вен;
- уменьшить растяжки и стрии,
- в борьбе с проявлениями целлюлита,
- облегчит состояние отечных ног при длительных нагрузках.

В основном же мазь Мадекассол, как и таблетки, используют для лечения склеродермии.

Рубцовые изменения кожи (в т.ч. келоидные, после тяжелых ожогов, травм и оперативных вмешательств); варикозное расширение вен нижних конечностей (в т.ч. вследствие приема ЛС, содержащих эстроген и/или прогестерон); трофические язвы, свищи; несостоятельность клапанного аппарата вен; склеродермия; восстановительная терапия после оперативного лечения лимфостаза; повреждения тканей после родов и акушерско-гинекологических операций (в т.ч. эпизиотомия, диатермокоагуляция); состояние после отоларингологических операций (в т.ч. тимпанопластика, фарингостомия); хронический отит; массаж гипертрофических и фиброзных рубцов; опрелость, \\\\"пеленочный\\" дерматит; хирургические раны и ожоги легкой степени.

Для местного применения мази Мадекассол имеется два важных ограничения - нельзя использовать мазь на мокнущих (сочащихся) ранах и при очень глубоком повреждении кожи. В таком случае по показаниям врач может рекомендовать Мадекассол в форме таблеток.

Способ применения

Мазь Мадекассол, как и любое другое лекарственное средство, следует применять только после консультации с лечащим врачом.

Оптимальным является применение мази Мадекассол 1-2 раза в течение дня. Мазь следует наносить на рану тонким слоем, возможно использовать Мадекассол под повязку. При необходимости перед нанесением мази следует провести антисептическую обработку раны.

Применение мази Мадекассол может вызвать в редких случаях реакцию по типу аллергической и диарею. В таком случае необходимо обсудить со своим лечащим врачом целесообразность дальнейшего использования данного препарата.

Особо обращаем внимание на то, что Мадекассол в форме мази не используется в офтальмологической практике. При нанесении мази на кожу около глаз избегайте попадания лекарства на слизистую оболочку.

Лечение мазью Мадекассол исключает возможность передозировки, так как препарат воздействует на организм пациента только местно.

Противопоказания

Ни в коем случае нельзя принимать средство тем людям, которые имеют повышенную чувствительность организма к веществам, которые входят в состав препарата. Кроме того, противопоказанием являются раны, которые очень глубокие. В таком случае местно применять средство нельзя. То же касается и ран, которые мокнущие. В этом случае нельзя использовать медикамент.

Мазь не предназначена для применения в офтальмологической практике, необходимо избегать попадания в глаза. Если это произошло, то необходимо тщательно промывать глаза чистой водой, а потом обратиться в больницу.

Применение при беременности

Возможно применение препарата беременными и кормящими женщинами.

Побочные действия

В редких случаях после использования мази возможно появление аллергической реакции. В таком случае лечение должно быть симптоматическим. Использование препарата необходимо прекратить. Однако побочные эффекты появляются крайне редко.

Условия хранения

Мазь Мадекассол сохраняет все свои свойства в течение срока годности. Для сохранения лечебных качеств мазь следует хранить при температуре не выше +25°C с плотно закрытой крышкой.